# ESTUDIO DE POBLACIONES DE LAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DE INTERÉS

## *A lo largo del Corredor a la Costa del Proyecto Cobre Panamá*

Preparado para:

Minera Panamá

por:

MWH

BUILDING A BETTER WORLD

***Octubre 2012***

# Contenido


| | |
|---|---|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| OBJETIVOS | 5 |
| METODOLOGIA | 5 |
| RESULTADOS | 11 |
| DISCUSIÓN | 287 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 334 |
| LITERATURA CITADA | 408 |

## INTRODUCCIÓN

La empresa Minera Panamá S.A. en conjunto con MWH, en marco del compromiso estratégico hacia el desarrollo sostenible y la política de normas de desempeño de la IFC, extiende este documento como prueba de gobernabilidad de sus acciones para con la conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos en su área de impacto. Dada la gran responsabilidad que representa la remoción de flora y fauna nativa para el emprendimiento de la explotación de metales de Cobre a nivel comercial, se han establecido lineamientos de explotación minera en el Distrito del Donoso, zona natural de Panamá. El equipo de MWH presenta en este documento, la información pertinente a la población de mamíferos, como parte del procedimiento investigativo para evaluar y conservar a las especies impactadas por el proyecto minero en el Donoso.

### Importancia de nuevos estudios de mamíferos en Panamá

En el Neotrópico, es difícil obtener información sobre el estado de las poblaciones de los mamíferos y más aún de especies que presentan comportamientos nocturnos, crepusculares o crípticos. Conocer el estado de las densidades y abundancias de mamíferos en un área es importante para obtener datos de línea base, los cuales pueden servir como plataforma para la creación de planes de manejo y conservación (Eisenberg & Thorington 1973). Basado en esto, se pueden realizar monitoreos a largo plazo, para estudiar cómo se comportan las poblaciones en; tiempo (y espacio), tipos de hábitats y cambios relacionados a la cacería y fenología del área (Wright et al 2000).

Los mamíferos en general están bajo el impacto de amenazas como la pérdida del hábitat, deforestación, fragmentación de las masas continuas de bosque y cacería ilegal (Ochoa & Gaona 2008, Polisar 2002). La fauna del bosque tropical está bajo mucha presión, sobre todo por el crecimiento de la población humana (Karanth & Sunquist 1992). Las causas mencionadas anteriormente, generan presión

sobre los mamíferos (depredadores y presas). El desarrollo y el incremento de poblaciones humanas en los límites de áreas protegidas o zonas boscosas traen como consecuencia la depredación sobre especies que son las principales presas de los carnívoros, lo cual crea un efecto de competencia directa (Jorgenson & Redford 1993).

La conservación y manejo de las poblaciones de fauna son cruciales, aparte de los beneficios económicos y nutricionales que pueden brindar, los grandes herbívoros ejercen un efecto directo e indirecto sobre la estructura forestal (Karanth & Sunquist 1992).

En Panamá, se cuenta con información base de los mamíferos presentes en el país (Méndez 1993, Samudio 2002) y existe información sobre como algunas de estas especies han continuado cruzando por nuestro Istmo desde hace aproximadamente 3 millones de años (Coates 2001, Webb 2003). Hasta el momento se cuenta con información de que existen unas 255 especies de mamíferos para Panamá (Samudio 2002). Sin embargo, se sabe que hacen falta más trabajos de campo en zonas de importancia para el país y se cree que por esta razón aún no han sido reportadas otras especies que quizás hayan ampliado su ámbito de distribución (Araúz 2005, Moreno 2006, Goldstein et al 2008).

**El Área de Donoso como zona de estudio para mamíferos**

El bosque del Distrito de Donoso, es una de las zonas menos estudiadas en el país, una de las áreas de bosque maduro más importante para el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) por su extensión no fragmentada y por estar en contacto con bosques de importancia como el Parque Nacional Omar Torrijos en la provincia de Coclé y el Parque Nacional Santa Fé en la provincia de Veraguas, los que a su vez forman parte de lo que llaman el corredor del jaguar (Zeller & Rabinowitz 2011).

Donoso, conocido ahora como área protegida de usos múltiple, alberga especies que se encuentran en peligro de extinción, vulnerable o son consideradas raras, como el jaguar (*Panthera onca*), tapir (*Tapirus bairdii*), perrito de monte (*Speothos venaticus*), oso caballo (*Myrmecophaga tridactyla*), águila harpía (*Harpia harpyja*), entre otras (Araúz B. com. per., Moreno R. & Méndez-Carvajal Obs. per., CITES 2007, Donoso 2010).

**OBJETIVOS**

Realizar un estudio de línea base de las poblaciones de mamíferos a lo ancho y largo del Corredor Biológico en el distrito de Donoso, desde el Campamento principal (MPSA) hasta la Costa en Punta Rincón del Proyecto Cobre Panamá que sirva para diseño y posterior monitoreo de fauna presente en la zona a impactar por Minera Panamá S.A.

**METODOLOGÍA**

**Área de Estudio**

El área de estudio se ubica en lado norte de la región central de la República de Panamá, con el rio Belén (limites entre las provincias de Veraguas y Colón) y provincia de Coclé, región Norte en las proximidades del Mar Caribe. Donoso forma parte de la eco-región de los bosques húmedos del lado Atlántico del Istmo y del corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP) provincia de Colón. Hacia el suroeste se encuentran los parques nacionales Omar Torrijos (El Copé) en la provincia de Coclé y Santa Fé en la provincia de Veraguas (IGNTG 2007).

La zona se caracteriza por una conformación geológica de rocas del periodo secundario, con elevaciones que llegan hasta los 484 msnm. El clima es de tipo tropical muy húmedo con abundantes precipitaciones durante todo el año. La precipitación oscila entre 5,000 a 5,500 mm/año. La temperatura se

encuentra en el rango de 24 a 27$^0$ C y la vegetación predominante es el bosque siempre verde perennifolio umbrófilo tropical latífoliado de tierras bajas (ANAM 2000).

Este tipo de bosque se caracteriza por presentar numerosas especies de plantas de crecimiento rápido, muchas de las cuales superan los 50 metros de altura. Es un bosque catalogado como a menudo verde con follaje casi todo el año y altura irregular por la presencia de árboles emergentes (UNESCO 1973, IGNTG 2007). De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1947) este bosque corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo tropical que se caracteriza por la presencia de árboles de gran tamaño como el espavé (*Anacardium excelsum*), el guácimo (*Luehea seemanni*), guavas (*Inga sp.*), fruta de mono (*Pachira aquatica*), almendro (*Diphysa oleifera*) y las platanillas (*Heliconias sp.*), entre otros.

**Método**

Para la estimación de la abundancia de los mamíferos, se utilizaron 108 cámaras trampas, modelo Cuddeback Capture, ubicadas en el sotobosque a la altura de 20-50 cm del suelo, con una capacidad de detección de movimiento y calor de 3-6 m. Las cámaras fueron distribuidas a lo largo de la línea de la carretera que va desde el campamento MPSA y la Costa en Punta Rincón (atraviesa el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño), cubriendo una línea total de muestreo de 20 Km aproximadamente.

Dependiendo del lugar elegido para las estaciones de cámaras trampa, se procedió a colocar una o dos cámaras por sitio, algunas estaciones (dos cámaras) de cámaras ubicadas una frente de la otra y otras estaciones con una separación de 6 m aproximadamente. Las cámaras fueron fijadas en los árboles con tensores y programadas para que funcionaran las 24 horas del día, con intervalos de 30 segundos entre activación del sensor.

Las estaciones fueron geo-referenciadas mediante el uso del sistema de posicionamiento global (GPS) y revisadas en un periodo máximo de 45 días para cambiar las baterías, memorias y absorbentes de humedad. Las estaciones de cámaras trampa estuvieron dispuestas a una altitud promedio de 95 msnm, (38-150 msnm). El distanciamiento entre puntos con cámaras estuvo entre 300 metros mínimos y hasta 1000 metros máximo. Los mayores distanciamientos se dieron por la lejanía entre espacios de aterrizaje de los helicópteros utilizados para accesar los sitios dentro de la zona de estudio.

**Estimación de la abundancia de especies de mamíferos**

Para las diferentes fases del proyecto, se colectaron los datos obtenidos durante 45 días de muestreo en la estación seca de Abril a Mayo de 2012 (primera ronda), 37 días de muestreo para estación lluviosa de Junio a Julio 2012 (segunda ronda), 45 días adicionales de estación lluviosa en Julio a Agosto de 2012 (tercera ronda) y **otros 45 de Agosto a Septiembre de 2012 (cuarta ronda).** Los datos por especie fueron utilizados para estimar el índice de abundancia (IA) basado en frecuencia de observaciones con cámaras trampa, aplicando la fórmula:

**IA = # total de foto capturas por especies/# total de noches trampa por 100.**

Una noche trampa es el periodo de 24 horas en el sitio donde las cámaras (estación) han funcionado durante ese periodo (Kawanishi 1995, Moreno 2006). Con el objeto de no sobre estimar la abundancia de los animales, se realizó un filtro en el cual sólo se tomaba la aparición de un individuo por especie por estación por día; es decir, cuando un animal (no identificable por manchas o marcas en el cuerpo) aparecía varias veces durante el mismo día, se asumió que era el mismo individuo (Bustamante 2008).

**Actividad circadiana**

Para determinar la actividad circadiana de los mamíferos, se utilizó las horas diarias de cada fotografía de acuerdo a Moreno & Bustamante (2009). El número de fotografías por especie de interés fue sumado por hora a lo largo de las 24 horas y posterior a esto se realizó un gráfico para observar como se distribuye la actividad de cada especie de interés a lo largo de las horas, obteniéndose un gráfico visual del comportamiento de actividad. Se definieron como horas diurnas las comprendidas entre las 06:00 hasta las 18:00 y nocturnas desde las 18:01 a las 05:59 horas (Moreno & Giacalone 2006).




**Figura 1a.** Mapa de las estaciones con las especies de mamíferos fotografiadas en las cámaras trampa y sus respectivos índices de abundancia por estación. Sección de la costa hasta medio tramo de la futura carretera.




**Figura**

respectivos índices de abundancia por estación. Tramo muestra la parte media de la futura carretera hasta la parte principal de la huella del proyecto (Estación 50 es en dirección hacia Campamento MPSA).

**Riqueza de especies**

Se produjo una curva de rarefacción para el área de Donoso por cada estación de cámaras trampa como una muestra y luego se recalibró el resultado por individuos, para ajustar la diferencia de la densidad de individuos entre las muestras (Gotelli & Colwell 2001, Colwell et al 2004). Este método permite cuantificar los niveles naturales de heterogeneidad de los datos en la muestra (Gotelli & Colwell 2001, Tobler et al 2008).

**Biomasa**

La diferencia entre la biomasa de los sitios fue probado utilizando el programa estadístico SPSS, versión 15. El promedio de la biomasa por especie fue determinado utilizando dos referencias bibliográficas (Smith et al 2003, Reid 2009). Se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis para comparar la mediana de la biomasa de todos los individuos en cada sitio. Luego, las diferencias significativas entre áreas se hicieron mediante una prueba conservadora de Scheffe Post-Hoc, para revisar si había diferencia entre sitios.

**RESULTADOS**

Se compiló un total de 9,863 noches trampa (primera ronda 2,250; segunda ronda 1,845; tercera ronda 2,390; cuarta ronda 3,378), se detectó un total de 29 especies de mamíferos terrestres (Cuadro 1). Se aprecia que la especie más fotografiada por las cámaras trampas en la primera, segunda, tercera y cuarta ronda fue *Dasyprocta punctata* (ñeque) y en segundo lugar *Didelphis marsupialis* (zarigüeya común), aunque para la tercera ronda se obtuvo de otras especies mayor numero de capturas. De las especies de interés para la zona sobresalen el *Tapirus bairdii* (tapir), *Pecari tajacu* (saíno), *Puma concolor* (puma), *Myrmecohaga tridactyla,* (oso caballo) y *Spheotos venaticus* (perrito de monte). Para la cuarta ronde de muestreo sobresale la aparición del puerco de monte (*Tayassu pecari*), la cual es una especie de gran importancia.

**Cuadro 1. Número de capturas por cada especie en las cuatro primeras rondas de muestreo.**

| | Especie | Nombre común | Índice de abundancia |
|---|---|---|---|
| DIDELPHIMORPHIA | | | |
| Didelphidae | *Didelphis marsupialis* | Zariguella común | 2.36 1.68 0.92 0.83 |
| | *Philander opossum* | Zorro de cuatro ojos | 0.04 |
| | *Metachirus nudicaudatus* | Zorro chocolate de cuatro ojos | 0.06 |
| PILOSA | | | |
| Myrmecophagidae | *Tamandua mexicana* | Oso hormiguero | 0.05 0.05 0.13 |
| | *Myrmecophaga tridactyla* | Oso caballo | 0.05 0.05 0.27 |
| CINGULATA | | | |
| Dasypodidae | *Dasypus novemcinctus* | Armadillo de nueve bandas | 0.68 0.76 0.71 0.47 |
| RODENTIA | | | |
| Dasyproctidae | *Dasyprocta punctata* | Ñeque | 18.59 14.4 17.74 16.49 |
| Cuniculidae | *Cuniculus paca* | Conejo pintado | 0.91 1.25 0.71 0.80 |
| Echimyidae | *Hoplomys gymnurus* | Rata espinosa | 0.82 0.38 0.13 0.24 |
| Sciuridae | *Sciurus granatensis* | Ardilla roja | 0,18 0,05 0.17 0.12 |
| LAGOMORPHA | | | |
| Leporidae | *Sylvilagus gabbii* | Conejo muleto | 0.13 0.09 |
| CARNIVORA | | | |
| Procyonidae | *Procyon lotor* | Mapache común | 0.05 0.06 |
| | *Procyon cancrivorus* | Mapache manglatero | 0.59 0.11 0.25 0.68 |
| | *Nasua narica* | Gato solo | 0.03 |
| Mustelidae | *Eira barbara* | Gato cutarro | 0.73 0.54 0.71 0.71 |
| | *Conepatus semistriatus* | Gato cañero | 0.05 0.05 0.17 0.06 |
| | *Galictis vittata* | Hurón | 0.03 |
| Felidae | *Panthera onca* | Jaguar | 0.17 0.21 |
| | *Puma concolor* | Puma | 1.54 1.63 2.72 1.45 |
| | *Leopardus pardalis* | Ocelote | 1.7 1.41 2.09 1.69 |
| | *Leopardus wiedii* | Tigrillo | 0.63 0.65 0.54 0.41 |
| | *Herpailurus yaguarondi* | Tigrillo congó | 0.27 0.22 0.21 0.30 |
| | *Leopardus tigrinus* | Oncilla | 0.08 0.12 |
| Canidae | *Speothus venaticus* | Perrito de monte | 0.05 0.06 |
| PERISSODACTYLA | | | |
| Tapiridae | *Tapirus bairdii* | Tapir | 0.68 0.16 0.29 0.39 |
| ARTIODACTYLA | | | |
| Cervidae | *Mazama americana* | Venado corzo | 0.27 0.05 0.13 0.36 |
| | *Odocoileus virginianus* | Venado cola blanca | 0.05 0.03 |
| Tayassuidae | *Pecari tajacu* | Saíno | 1.41 0.92 2.64 3.85 |
| | *Tayassu pecari* | Puerco de monte | 0.09 |
| PRIMATES | | | |
| Hominidae | *Homo sapiens* | Humanos-cazadores* | |
| Cebidae | *Cebus capuchinus* | Mono cara blanca* | |
| AVES | *Penelope purpurascens* | Pava* | |
| | *Crax rubra* | Pavón* | |
| | *Tinamus major* | Gallina de monte* | |
| | *Cathartes aura* | Gallinazo cabeza roja | |
| | *Leptotila cassini* | Paloma* | |
| Todas las especies | | | 24 25 25 31 |
| Mamíferos terrestres | | | 19 20 21 27 |
| Numero de fotos de mamíferos terrestres | | | 696 448 733 1010 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Esfuerzo de muestreo | 2250 | 1845 | 2390 | 3378 |

* Especies no incluidas en el análisis. Los colores negro, azul y naranja representan respectivamente los datos de la primera, segunda y tercera ronda del muestreo.

En base a los resultados por estación de trampas cámaras a lo largo de la línea de la carretera se observa que el número total de fotos obtenidas, no hubo distribución uniforme, ya que se logró ver varios picos de actividad en las cámaras, aunque hay uno en especial muy marcado con más de 50 capturas para la primera ronda del muestreo (Figura 2).




**Figura 2.** Número total de captura por cámaras trampa a lo largo de la línea de la carretera, entre el campamento y la costa en las cuatro rondas de muestreo.




**Figura 3.** Número de especies por estación de cámaras trampa a lo largo de la línea de la carretera, entre el campamento y la costa en las cuatro rondas de muestreo.

En la Figura 4, se observa que especie fue captada con un número mayor de frecuencia por estación de cámaras trampa. Por ejemplo, se aprecia que en la estación 2, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 45 y 47 hay aparición de saínos, siendo la estación 25 y 39 donde aparecieron con mayor frecuencia. Además se observa la aparición de los puercos de monte en las estaciones 31 y 37.




**Figura 4.** Numero de especies de interes (EDI) capturadas por las camaras trampa a lo largo de la linea de la carretera, entre el campamanto y la costa en las tres rondas de muestreo.

**Indice de abundancia**

Se aprecia claramente en la Figura 5a, 5b, 5c y 5d, que a lo largo de lo que va del año, las especies se van moviendo y aparecen con mayor frecuencia en lugar donde algunas veces aparecian con menor frecuencia, lo que nos indica que son especies que se mueven dependiendo de las variables que existen en el ambiente y de sus requerimientos ecologicos para que ellospuedan cumplir con sus necesidades vitales para sobrevivir en el ambiente.




**Figura 5a.** Indice de abundancia del tapir, saínos y oso caballo o hormiguero gigante por estación de cámaras trampa, a lo largo de la línea de la carretera en 45 días.




**Figura 5b.** Indice de abundancia del tapir, saínos y oso caballo o hormiguero gigante por estación de cámaras trampa, a lo largo de la línea de la carretera en la segunda ronda de muestreo.




**Costa** **Hacia campamento**

**Figura 5c.** Indice de abundancia del tapir y saínos por estación de cámaras trampa, a lo largo de la línea de la carretera en la tercera ronda de muestreo.




**Figura 5d.** Indice de abundancia del tapir, saínos, puerco de monte y el oso caballo por estación de cámaras trampa, a lo largo de la línea de la carretera en la cuarta ronda de muestreo.

Se observa que en las Figura 6a, 6b, 6c y 6d, las especie de felinos al igual que en las figuras 5 a, b, c y d, tambien presentan un comportamiento de movilidad muy variable, se observa que aparecen en diferentes localidades a lo largo de la linea de la carretera. Se aprecia de igual forma como los indices de abundancia de las diversas especies son altos o bajos en las estaciones a lo largo del año. Esto debe de obedecr a sus movimientos espaciales y temporales dependendiendo del movimiento de sus presas principales y en caso de los machos a los movimientos de las hembras que patrullan la zona. Ademas, se incluyen datos del perrito de monte, una especie muy criptica, que hasta la fecha la mayor cantidad de informacion que se tiene es anecdotica.




**Costa** **Hacia campamento**

**Figura 6a.** Índice de abundancia de cuatro especies de felinos que aparecieron en las cámaras trampa a lo largo de la línea de la carretera en la primera ronda de muestreo.




**Costa** **Hacia campamento**

**Figura 6b.** Índice de abundancia de cuatro especies de felinos y una especie de cánido que aparecieron en las cámaras trampa a lo largo de la línea de la carretera en la segunda ronda de muestreo.




**Figura 6c.** Índice de abundancia de felinos que aparecieron en la tercera ronda de muestreo a lo largo de la línea de la carretera en la tercera ronda.




**Figura 6d.** Índice de abundancia de felinos y el perrito de monte que aparecieron en la cuarta ronda de muestreo a lo largo de la línea de la carretera.

**Riqueza de especies**




**Figura 7.** Curva de rarefacción basada en la muestra de Donoso, en donde el eje X son los registros de observaciones. La curva se dibujo con una rarefacción muestreada incluyendo los datos de la primera, segunda, tercera y cuarta ronda de muestreo. Cada estación (o cámara) consistió de 45 días de monitoreo para la primera ronda, 37 días para la segunda (por agotamiento de las pilas a causa de la humedad relativa), 45 días la tercera y 45 días la cuarta ronda. La gráfica nos indica que todavía se puede encontrar un número mayor de especies.

**Comparación con otros sitios**

La comparación basada en la curva de acumulación de especies para Donoso con cada uno de los otros lugares en el mismo nivel nos revela que Donoso es igual de rico en especies que Darién y Chagres e inclusive mas rico en especies que el Soberanía, Monumento Natural Isla de Barro Colorado, en términos de riqueza de especies (Figura 8). Sin embargo, a pesar que el número final de especies detectadas en Donoso fue mayor, la curva no fue tan pronunciada como la de Chagres y Darién. La curva de Chagres, Monumento Natural de BCI y Soberanía se nivelaron, mientras que la de Darién y Donoso, muestra que todavía puede continuar aumentando la riqueza de especies si continúan los muestreos. La riqueza de especies de Donoso

difiere significativamente de los otros sitios, pero con Darién solo ligeramente con una $p < 0.005$ y un intervalo de confianza que no solapa con ninguno de los sitios (Figura 9). Esto también se debe a que la muestra en Donoso es mayor que en los otros lugares mencionados donde usualmente el muestreo no supero los 55 días.




**Figura 8.** La curva de rarefacción basada en individuos entre sitios diferentes a lo largo de Panamá, representa la media de repeticiones re-muestreadas de un grupo de individuos en una escala logarítmica. Esto se puede ver solo en un estudio de monitoreo de largo plazo, vemos como se separa la línea de Donoso con respecto a las otras.




**Figura 9.** Intervalos por encima y por debajo de 95% del intervalos de confianza de la curva de rarefacción de individuos basados en la curva de rarefacción de Donoso no solapa con otros sitios excepto Darién. Esta riqueza de especies es estadísticamente diferente a todos los otros sitios con excepción de Darién, desde un punto de vista de especies (la línea no se estabiliza).

**Igualdad de especies**

La igualdad o homogeneidad de especies fue bajo en Donoso (Índice de Shannon = 0.58), similar a Monumento Natural BCI (0.64), con una dominancia de unas pocas especies comparadas con otras especies sugeridas (Figura 10). La abundancia relativa del ñeque fue cinco veces más alta que la segunda especie más abundante (el pavón, especie de ave, datos no presentes en este informe). Estas abundancias no fueron tan altas para Darién, Chagres y Soberanía, lo cual probablemente aumenta la igualdad u homogeneidad (0.85, 0.87 y 0.79 respectivamente para los tres sitios). Estadísticamente, ninguna de las abundancias relativas de las especies fue significativamente diferente uno del otro.




**Figura 10.** Grafica del rango de la abundancia por sitio. Para Donoso la curva cae dramáticamente después del rango 1, igual que en el Soberanía, BCI y las Península, esto se debe al número de capturas de ñeques en los sitios de estudio.

**Actividad circadiana**

La actividad circadiana es el ritmo o patrón de actividad que tienen las especies a lo largo de las 24 horas del día, lo que seria el reflejo de sus movimientos ya sean diurnos o nocturnos (Figura 11, 12 y 13). En la figura 11 se observa que los pumas presentan una mayor actividad en las horas del día y el ocelote en las horas de la noche. Para el jaguar es difícil decir que comportamiento de actividad tiene y esto se debe a la falta de información con la que se cuenta hasta el momento. En la figura 12, se observa que los saínos son de comportamiento de actividad diurna y el tapir con preferencias nocturnas. Mientras que en la figura 13, es fácil apreciar que los ñeques son diurnos y los conejos pintados son nocturnos.




**Figura 11**. Actividad circadiana del ocelote, el jaguar y el puma en Donoso. Se aprecia claramente la tendencia de que los pumas son más diurnos que los ocelotes y los pocos datos que hay de jaguares son de preferencia nocturna..




**Figure 12**. Actividad circadiana del tapir y de los saínos. Se aprecia que el tapir es de hábitos más nocturnos que el saino.




**Figure 13.** Actividad circadiana del ñeque y el conejo pintado en Donoso. Estos dos roedores se desplazan en horas diferentes a lo largo del día.

**Biomasa**

Logramos observar que la biomasa de los animales en los 6 diferentes sitios difieren significativamente en algunos y en otros no (Kruskal-Wallis, $Chi^2$= 454.6, df=5, p-value<0.001). La prueba de Sheffe Post-Hoc revela que Donoso es diferente a Darién y Chagres en términos de la biomasa de individuos, pero no difiere significativamente de los otros lugares (Figura 14).




**Figura 14**. Las cajas representan la mediana de la biomasa en kg con el cuartil de todos los individuos registrados en los seis sitios (hay valores extremos y los valores desiguales están escondidos). A y b son diferentes, mientras que c son similares. Los asteriscos al extremo superior representan animales de gran masa corporal como los tapires y pumas.

## DISCUSIÓN

### Abundancia de mamíferos en Donoso

Nuestro objetivo fue conocer la abundancia poblacional de mamíferos en el área de Donoso, que es también parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Se utilizaron los datos del muestreo de cámaras trampa de los mamíferos vertebrados y se les comparó con otros cinco sitios del corredor.

Los ñeques en todos los sitios de estudio fueron la especie con un índice de abundancia mayor (Cuadro 1), esto se debe a lo prolifero que es esta especie de roedor (Moreno 2006, Moreno & Bustamante 2007, 2008, Bustamante 2008, Meyer 2011). Donoso presentó una abundancia relativa alta de ñeques *Dasyprocta punctata* en contraste con los resultados obtenidos en previos estudios para las regiones de Darién y Chagres (Moreno 2006, Moreno & Bustamante 2007). Ecológicamente al ser los ñeques prolíferos, los depredadores como ocelotes y pumas principalmente aprovechan el recurso disponible (abundancia relativa alta) y los utilizan como una de sus presas predilectas (Aliaga-Rossel et al 2006, Moreno 2006, Moreno et al 2006). En efecto, en los recorridos se han encontraron nueve excretas de puma, las cuales contenían restos de pelos ñeques, perezoso de tres dedos, armadillos y de saíno (Moreno R. Obs. per.). Además, se localizó una excreta de jaguar, la cual contenía restos de pelos de perezoso de tres dedos (Méndez P. y R. Moreno. Obs. pers.).

### Especies de Interés de mamíferos para el Proyecto

Se logra apreciar con los datos generados hasta el momento que en el área de Donoso existe una diversidad de mamíferos impresionante en comparación con otros lugares en Mesoamérica. Especies que son raras o extintas en otros lugares en Donoso parecen estar en un buen estado, como es el caso del oso caballo, el cual presento una abundancia mayor en la última ronda que el hormiguero pequeño, el cual es más común. Los tapires, saínos y puercos de monte, los cuales son considerados como arquitectos del bosque, lo que

indica junto con os felinos como jaguares y pumas que hasta el momento se está dando el balance que usualmente existe en los bosques no intervenidos (Altrichter et al 2012)

**Biomasa**

Se esperó similitud en la biomasa por kg de los mamíferos en relación a Darién por sus características ambientales, pero, se observa que Donoso aparece como uno de los menores en cuanto a esta variable. La Figura 14 denota que la balanza se inclina gracias a la mayor cantidad de ñeques fotografiada en la zona (Figura 10), provocando una caída en la biomasa, aunque el área presenta mega fauna como los tapires y pumas (Meyer 2011). Sin embargo, estos datos no cuentan con cálculos de biomasa para el grupo de Primates y Chiroptera, de alta abundancia en el bosque tropical, por lo cual su inclusión haría una diferencia significativa en dichos valores (Méndez-Carvajal, Obs. per.).

Los tapires, especies de masa corporal grande (Emmons 1997, Reid 1997& 2009), a pesar de su talla, no presentan ámbitos tan extensos como se espera y al mismo tiempo prefieren áreas de bosques secundarios, dado a una mayor diversidad de alimento, composición y estructura que un bosque primario (Foerster & Vaughan 2002).

**Especies raras**

Una de las rarezas del estudio fue el obtener evidencia del oso caballo *Myrmecophaga tridactyla* para las dos primeras rondas de muestreo, ya que se cuenta con poca información para esta especie a nivel Centro Americano. Es de suma importancia obtener más información de esta especie, ya que a nivel de Centroamérica es hasta el momento el mamífero más amenazado. Se estima que en los últimos 10 años aproximadamente se ha perdido un 30% de su población, principalmente por causas como la pérdida del hábitat, muertes causadas por fuego y animales atropellados (Superina et al 2010).

Se considera necesario generar nueva información del oso caballo por medio de proyectos de monitoreo de largo plazo, porque solo de esta manera podrá conocerse su ecología a lo largo del tiempo en los diferentes lugares donde habita. Por ejemplo; hay ausencia de datos sobre longevidad, tasas de sobrevivencia y tasas reproductivas de la especie (Superina et al 2010).

El perrito de monte *Spheotos venaticus* también se considera un avistamiento importante ya que es un animal que carece de estudios en Panamá y cuenta con pocos registros fotográficos, aunque existe información anecdótica que lo reporta en algunos lugares a lo largo del corredor biológico del Atlántico en Panamá (Donoso 2010, R. Moreno y A. Guevara Obs. per.), con excepción de los bosques en la Provincia de Bocas del Toro y Chiriquí. También, es importante señalar que en la tercera ronda se obtuvo fotos del felino más pequeño, la oncilla el cual es el felino menos foto capturado en los estudios de cámaras trampa en Panamá y Costa Rica (Moreno R. obs. pers.), esto se debe a que esta especie es semi-arbórea y utiliza muy poco los caminos.

Para la cuarta ronda se logra fotografiar una de las especies más perseguidas cinegéticamente en Panamá, resto de centro américa y el sur, el puerco de monte (*Tayassu pecari*). Esta especie de puerco silvestre es una de las principales presas del jaguar en todo el rango de distribución geográfico en donde las dos especies se sobreponen. Para la lista Roja de la UICN esta especie está cerca de estar amenazada, pero los datos a nivel nacional (solo Panamá) reflejan que esta especie debería estar en un nivel de Vulnerable, gracias a la cacería ilegal y el avance de las fronteras agrícolas, ganaderas y de modernización (construcción de carreteras, industrias entre otras actividades) hacen que esta especie se retire de las áreas donde usualmente habita, los cuales son bosques extensos (grandes áreas) con poca o ninguna perturbación (Altrichter et al 2012, Reyna-Hurtado et al 2008, Fragoso 2004).

**Especies de felinos**

La especie de felino con mayor abundancia fue el ocelote *Leopardus pardalis* para la primera, segunda ronda y cuarta ronda, mientras que en la tercera ronda fue el puma *Puma concolor*. Se sabe que los ocelotes tienen capacidad para adaptarse a diferentes tipos de hábitat y según el hábitat tienen la capacidad de desplazarse por áreas extensas de terreno en relación a su tamaño corporal (1- 35 km$^2$) (Sunquist & Sunquist 2002, Maffei et al 2005, Moreno et al en revisión, Moreno & Bustamante 2009). Los pumas *Puma concolor*, mostraron una abundancia similar al ocelote en las cuatro rondas, aunque mayor en la tercera. Se observa que la abundancia en los pumas es mayor y en especial en algunas estaciones, esto se debe a la captura de muchas fotos de una hembra acompañada por varios machos, lo que hace pensar que estos individuos estaban en época de apareamiento. En la tercera ronda se obtuvieron fotos de dos jaguares (un macho y una hembra, lo que sugiere una población de jaguares relativamente baja dado al espacio de tiempo en que los individuos han aparecido en las cámaras (5 meses después que se colocaron las estaciones). Este es un dato representativo ya que son pocos individuos y que al mismo tiempo estos pueden estar utilizando áreas de actividad grandes (Moreno 2006, Cavalcanti & Gese 2009).

Se sabe que los felinos como jaguares utilizan áreas extensas de terreno y al mismo tiempo estos tienen la capacidad de trasladarse a largas distancias en una noche (20-40 Km. lineales R. Núñez com. pers.). Los resultados concuerdan con otros trabajos en donde los felinos grandes utilizaron áreas extensas de bosque, pasando muchas veces desapercibidos a los muestreos de cámaras, ejemplo: jaguar macho 159 km$^2$ y una hembra 121 km$^2$ en Cana, Darién. Mientras que varios pumas machos en promedio se movieron entre 58 hasta 167 km$^2$ (Moreno 2006).

En las zonas aledañas a la huella del proyecto, las evidencias más recientes sobre jaguares fue la de un ejemplar matado por depredar tres terneros cerca de la costa y al margen del Río Caimito en febrero de

2012. También, hay reportes de depredación a algunos novillos, una vaca y un toro por parte de jaguar cerca de Coclecito entre enero y el mes de Mayo de 2012 (Rodríguez, O. com. per.). Se conversó con personas de la comunidad de Coclesito y manifiestan que desde el 2004 hasta la fecha reportan siete jaguares sacrificados principalmente por depredar terneros, novillos, vacas y toros. Se piensa que los felinos solo tienen sus actividades en las noches. Los datos generados por cámaras trampas y radio telemetría han revelado que en algunos casos esta hipótesis no se cumple (Moreno et al en revisión). En la gran mayoría de los lugares estudiados en Panamá y otros sitios donde se han realizado trampeos con cámaras, se ha notado que los pumas tienen mayor actividad diurna que las otras especies de felinos (Bustamante 2008, Bustamante et al 2009, Monroy-Vilchis et al 2009 y esta estudio). Sacrificado es

Se reporta que para el mes de septiembre del presente año fue matado un jaguar macho adulto y hasta el momento todo indica que el individuo sacrificado es el macho adulto capturado por las cámaras trampa para la tercera ronda de muestreo. Se cree esto porque para la cuarta ronda de muestreo este individuo no apareció y solo se foto capturo la hembra. Esto puede ser comprobado de forma exitosa si se logra conversar con la persona que lo elimino por depredar ganado doméstico. Se espera que se logre comenzar con un programa de educación ambiental lo más pronto posible, para así de esta forma contrarrestar estos sacrificios.

**Otras especies de interés**

Los saínos *Pecari tajacu* al igual que en otras localidades, son de hábitos diurnos y los tapires tienden a ser más nocturnos (Moreno 2006). En el tapir, se piensa que este tipo de comportamiento es una reacción defensiva a la presión que ejercen los seres humanos hacia ellos, ya sea por la cacería o algún otro tipo de actividad (Foerster 1998). Especies como los ñeques presentan periodos marcados de actividad diurna muy común en esta especie (Aliaga-Rossel et al 2006). Otros roedores de mayor tamaño como el conejo pintado

presenta un comportamiento totalmente contrario, su actividad es nocturna, reflejo de una separación ecológica entre ñeques y conejos pintados quienes utilizan el mismo nicho ecológico (Bustamante 2008).

**Riqueza de especies de mamíferos en Donoso**

El área de Donoso presentó una distribución variable de las especies avistadas por las cámaras trampa a lo largo de la línea de la carretera, pudiéndose observar que el número total de especies reportadas no fue definido al ver varios picos en las capturas en las cámaras trampa, aunque en una zona aparecieron más de 50 fotos (Figura 2). Este exceso de fotos se debe a la gran frecuencia de veces que los ñeques activaron el sensor de las cámaras por su actividad en la zona. Además, se observa que los datos por número de especies por cámaras fueron bastante similares. Se interpreta que las especies están bien distribuidas a lo largo de la línea de la carretera (Figura 3). Sin embargo, se esperaba que en el área de la costa hubieran aparecido menos especies y menos tomas, pero no fue el caso. Estos datos dan la impresión que algunas de las especies se han adaptado a la presencia humana, entre estas jaguares, ocelotes, venados y sainos.

Los estudios en el Donoso al igual que los estudios de mamíferos realizados en la provincia de Darién, presentan un número acumulativo de especies que al final de la curva no logra estabilizarse. Podemos atribuir este patrón a que estas especies no están sometidas a grandes presiones antropogénicas, y es por esto que sigue en aumento la curva.

Se sabe que para Donoso y Darién podemos todavía encontrar un número mayor de especies, gracias a las particularidades de cada lugar y lo poco que se sabe de estas dos áreas, Darién con una gran influencia del bosque del Chocó y Donoso por todavía poseer áreas vírgenes que puedan servir de hábitat donador. Tal es el caso del perrito de monte *Speothos venaticus*, que también cuenta con registros en el área del Parque

Nacional Santa Fé (Donoso 2010). Hay información sobre la oncilla *Leopardus tigrinus* para el Parque Internacional la Amistad y Darién, y del puerco de monte *Pecari tajacu* en zonas poco perturbadas y visitadas del Parque Nacional Santa Fé y áreas cercanas a Miguel de la Borda (com. per. con lugareños y además se sabe que existió de forma abundante en la zona por lo menos hace unos 19 o 20 años, Jaramillo C. com. per.). El mantener un monitoreo a largo plazo, ayudará a obtener la mayor cantidad de especies posibles y al mismo tiempo prestar atención a las oscilaciones poblacionales en el tiempo (Carrillo et al 2000, Olmos et al 2009, Bustamante et al 2011).

**CONCLUSIONES**

- Se debe tener en cuenta que si se logran realizar y establecer las recomendaciones aquí planteadas, se tiene la certeza que el funcionamiento del corredor podrá ser probado a lo largo del tiempo, incluyendo principalmente las especies de interés de todos los grupos incluidos (anfibios, reptiles, mamíferos, entre otros).

- El muestreo con cámaras trampa debe ser complementado con otros sistemas de detección de animales, ya que el mismo no reportó especies de hábitat arbóreo tales como los monos aulladores, una de las especies que contribuye con mayor rapidez a la dispersión de semillas y polinización, acelerando procesos de continuidad y regeneración de los bosques.

- Aunque el área de Donoso es catalogada como de tierras bajas, presenta muchas ondulaciones. Dicha topografía hará posible que se construya la carretera tomando en consideración pasos de fauna adecuados para facilitar la movilidad de mamíferos en la zona impactada.

- Se concluye que el área de Donoso es un lugar con una biodiversidad alta, y sabemos que si se logra establecer un monitoreo de cámaras trampa a largo plazo, tomando en cuenta estudios ecológicos de animales como jaguares, tapires, algunas especies de monos, entre otros, esto permitirá que el Corredor Biológico Mesoamericano, siga viable y que las especies que la zona alberga puedan ser estudiadas en un hábitat conservado.

**Recomendaciones para el diseño de las estructuras de pasos de mamíferos**

- Es necesario crear pasos de fauna terrestres y además para especies arbóreas. Es de importancia que las especies atraviesen la apertura de bosque que va a ser creada por la carretera, y que abarcará 10 o más metros de ancho.

- Se debe incorporar puentes y túneles para pasaderos de mamíferos en zonas de importancia y con mayor frecuencia de mamíferos de diferentes especies, incluyendo como primordial las especies de interés para el corredor Biológico y el proyecto de Minera Panamá. Para esta parte es complementario contar con el apoyo y colaboración de un especialista en pasos de fauna Mario Arosemena Ceballos candidato al Ph.D, quien cuenta con el entrenamiento especifico parta este tipo de proyectos. Si logramos combinar la información ya obtenida en el campo y la experiencia de Mario, podremos contar con mejores puntos en donde estaríamos seguros que los animales van a utilizar.

- Para algunas especies arbóreas menos crípticas como los Primates y Murciélagos, se ha logrado obtener datos *ad-libutum*, sin embargo, sugerimos la participación de Pedro Méndez-Carvajal, especialista en mamíferos, en particular en grupos de Chirópteros y Primates. La participación de Pedro Méndez-Carvajal M.Sc. en nuestro equipo de trabajo permitirá evaluar de una forma más adecuada, las especies de murciélagos y primates no humanos entre otros animales arbóreos, presentes en el área de estudio. "Es de suma importancia para la futura regeneración de los bosques y el estudio de la ecología del hábitat muestreado, reconocer que especies de mamíferos

arbóreas existen y como contribuyen a la diseminación, polinización y control de otras especies ya que influyen directamente con la diversidad y zonificación de especies de árboles, especies de insectos y especies de mamíferos presa de importancia para depredadores terrestres como jaguares y aéreos como el Águila Arpía" (Méndez-Carvajal Obs. per).

- Si se desea conocer si los animales continúan el flujo de un lado al otro de la carretera, será crucial marcar animales y monitorearlos, principalmente con cámaras trampa, radio telemetría convencional o de GPS y por medio de observaciones de rastros y huellas.

- Para contar con una mejor idea de cómo la carretera podría afectar o no el flujo de la fauna de un lado hacia el otro, se establecerá una línea de cámaras trampa a manera de control y esta se establecerá paralelo a la línea de cámaras trampa de la carretera. De esta manera se puede comparar en el tiempo si hay o no un efecto negativo de la misma.

- Se recomienda que para cuando la carretera esta lista para su funcionamiento, se establezcan limites de velocidad que sean realmente cumplidos. Utilizando los datos de actividad circadiana es posible ver que varias de las especies de interés del proyecto se mueven en las horas del día (horas de posible mayor actividad en la carretera) como el oso caballo, los saínos, jaguares y pumas, entre otras. Es recomendable que para que no ocurran atropellos los limites máximos de velocidad permitida sea de 50 km/hora, y además en los puntos escogidos como de mayor transito de animales y uso de las especies de interés se coloquen "policías muertos" efectivos y que hayan policías (Sierras) los cuales también estén presentes en lugares estratégicos donde puedan dar multas a las personas que sobrepasen los limites de velocidad establecidos.

- Para un mejor establecimiento de los futuros lugares de pasos de fauna se necesita obtener mayor información de las cámaras trampa y que el Biólogo encargado (R. Moreno) sea acompañado al campo por los otros dos especialistas antes mencionados (e incorporados al grupo de trabajo) (P.

Méndez–Carvajal (pasos de fauna para el dosel) y M. Arosemena Ceballos (pasos de fauna terrestre).

**Recomendaciones para el monitoreo de fauna y aplicación de radio telemetría**

- Se recomienda establecer un programa de educación ambiental dirigido a las personas que son directamente afectadas con el conflicto entre grandes felinos (pumas y jaguares) y ganaderos. Además se espera impartir charlas a los muchachos de las escuelas y colegios en Coclesito, Punta Rincón y lugares cercanos. También se dictaran charlas en salones comunales y a cualquier grupo o persona que vivan en o cerca del área de estudio. Se debe tener en cuenta que la clave de la conservación es la educación. La Fundación Fondo Pergrino-Panamá, Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP) y Yaguará en Costa Rica han aplicado con éxito estos programas de charlas educativas que no solamente informan al local sino que mantienen una comunicación efectiva con los pobladores dentro del área de estudio.

- Para un mejor planeamiento y seguimiento de las especies de interés, en este caso jaguar y tapir, se recomienda realizar un trampeo, esperando capturar un mínimo de cinco individuos por especie para contar con datos más heterogéneos (mayor cantidad de individuos) a la hora de hacer inferencias sobre el comportamiento y movimiento espacial de estas especies en la zona de estudio. Para la toma de datos se recomienda colocarles collares con GPS incorporados, por que son animales que se desplazan grandes distancias (especialmente los jaguares) y con estos collares se puede obtener información las 24 horas del día, sin tener que seguir a los individuos todos los días, solo en los momentos que es necesario. Con un mínimo de cinco jaguares radio marcados se podría obtener información valiosa de individuos que atraviesan o no indiferentemente el área de la línea de la carretera, uso del hábitat, ámbitos hogareños, corredores y demás zonas por donde se desplazan para viajar. Al capturarlos, se podrán colectar también información que van a servir para realizar análisis genéticos (muestreas de sangre, pelo, ectoparásitos, etc.) y de esta forma determinar la variabilidad genética. Al realizar los recorridos es posible colectar excretas, las cuales también

funcionan para obtener información sobre la variabilidad genética (principalmente jaguares, pumas y tapires entre otras especies de interés). En el caso de los tapires, se sabe que Panamá no cuenta con información ecológica sobre aspectos de movimientos espaciales y temporales y además de ámbitos de hogar.

- Recomendamos el monitoreo de primates no humanos en la zona, como complemento a los monitoreos realizados en el sotobosque. Debido al impacto indirecto que ejerce el grupo Primates, es menester mantener una clara relación entre el papel que desempeñan los dispersores de semillas en el hábitat del Donoso y como estos guían a los animales como conejos pintados, zainos, venados, ñeques, entre otros a sus frutos. Para este efecto sugerimos el uso de cámaras trampa de dosel, propuesta que esta por presentarse en próximos días. Este complemento será crucial para conocer la ubicación de pasos de dosel y pasos de fauna terrestre, ya que muchos animales siguen la fenología del sitio y prefieren pasar por zonas en donde ya saben hay arboles en fruto y floración, su mayor guía en este aspecto son sin lugar a dudas la presencia de monos en el dosel.

- Por otro lado, el cálculo poblacional de primates no humanos que se genere en este estudio preliminar podrá servir directamente para medir a nivel numérico el progreso de especies que han sido diezmadas por el hombre en la zona del Donoso. Basado en conocimiento previo, entrevistas informales con los lugareños, hemos podido detectar que la presión de cacería a los monos ha podido diezmar la población de monos aulladores y cariblancos, lo cual explicara una baja densidad de grupos como se observa en Donoso (Méndez-Carvajal, obs. pers.). La población indígena Ngöbe Bugle es conocida y citada como etnia que utiliza al mono (araña, aullador y cariblanco) como especies comestibles, y pueden diezmar poblaciones en tanto se van movilizando en su migración nómada, efecto similar ha ocurrido en la Península de Azuero con el mono araña y aullador en la Reserva Forestal El Montuoso (Méndez-Carvajal 2011). La presencia de esta etnia posteriormente convence a otros lugareños a utilizar la carne de monos como otra fuente de proteína y eventualmente termina ocurriendo una presión de cacería. Si las iniciativas de educación ambiental y conservación de zonas boscosas son aplicadas, sugerimos se utilice la densidad de monos como un indicador principal para conocer el éxito de nuestro proyecto de conservación y compensación, ya que es visible y detectable con mayor seguridad. Se necesitara continuar monitoreos que verifiquen la baja densidad poblacional y otros aspectos importantes para este caso en particular.

- Nuevamente, respecto a los jaguares (y tapires), si se logran capturar varios jaguares, se sabrá

por donde estos animales caminan y de esta forma se podrán monitorear/cuidar los individuos con collares y ver si algunos o todos los jaguares son depredadores de ganado y de una forma directa (especie/ganadero o campesino) realizar una campaña a nivel educacional y de apoyo económico a las personas que sufran perdidas de animales domésticos. Se sabe que si los moradores no son apoyados lo único que les queda es eliminar al felino causante de la depredación, lo cual seria la continuación de lo que ha venido pasado desde hace unos 20 o 30 años. Se debe tener en cuenta que los collares GPS brindan información bastante precisa de la ubicación del individuo, lo cual es muy valioso en este tipo de estudio y el por que y para lo que se desea monitorear. Es importante mencionar que un buen programa de conservación debe ir de la mano con programas de compensaciones y remuneraciones, por que la conservación per se no es viable a corto ni a largo plazo (Schaller 2011). Otras actividades que pueden ser incluidas es el pago de servicios ambientales (pago por hectárea de bosque), colocación de cámaras trampas en las fincas de personas afectadas por depredación de ganado, campesinos y cazadores, en donde se realice un pago el cual incentive de manera positiva al propietario de la finca si por ejemplo sale un jaguar fotografiado, un tapir o un oso caballo (Bustamante et al 2011).

- Si se desea obtener información espacial de las especies de interés dentro de toda la zona de estudio (Donoso), será necesario establecer un muestreo espacial de cámaras trampas, por que solo de esta manera se podrían estimar las poblaciones de las especies que son fáciles de identificar individualmente por medio de marcas a patrones en las pieles como en el caso de felinos manchados como los jaguares. Para obtener el tamaño poblacional y la densidad absoluta podremos utilizar el programa CAPTURE (Otis et al 1978, Rexstad & Burham 1991). Con los supuestos de población cerrada (sin nacimientos, ni muertes, sin inmigración y emigración) (Karanth et al 2004, Moreno 2006, Bustamante 2008, Harmsen et al 2009). En base a la información colectada por las cámaras distribuidas de forma espacial en un área mínima de un polígono de 100 $km^2$ y óptima de 300 $km^2$ se puede construir un historial de captura de las especies de interés identificadas por los patrones de manchas o marcas. Se bebe tener en cuenta que las cámaras trampas y la telemetría son complementarias y si utilizamos ambos nos acercamos más a la realidad del sistema biológico en el cual estamos trabajando (Moreno & Bustamante 2009).

- Se recomienda que los especialistas reciban un entrenamiento extra, principalmente en la captura y manejo de los tapires. Se sabe que R. Moreno tiene amigos en diversos países de América los cuales tienen la experiencia en la captura, sedaje y colocación de collares en tapires. El Dr. Rafael Reyna-Hurtado el cual reside en Campeche, México lleva a cabo un proyecto de investigación con puercos de monte y tapires en estos momentos. También el Dr. José Manuel Fragoso esta dispuesto a colaborar en este proyecto. Los dos se ha ofrecido amablemente a colaborar con R. Moreno en este tipo de proyectos.

- Se recomienda la utilización de búfalos de agua en lugares donde haya depredación de ganado por felinos. Esto constituye una alternativa para reducir el ataque de jaguares sin la necesidad de cacería. Se cuenta con información que los búfalos hembra demuestran un comportamiento de defensa del rebaño formando un círculo alrededor de sus becerros con los toros caminando alrededor del círculo, bramando y buscando al depredador activa y de forma agresiva. El experto en la materia es el Dr. Rafael Hoogestjein quien es colaborador y amigo del Biólogo R. Moreno. El Dr. Hoogestjein ha probado en Venezuela y actualmente en Brasil el uso de los búfalos y los datos demuestran que la técnica si es llevada a cabo de la mejor forma funciona.

**LITERATURA CITADA**

ANAM. 2000. Informe Borrador. Mapa de Vegetación de Panamá. Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, Panamá. 51 pp. Anexos, mapa.

Aliaga-Rossel, A., R. Moreno, R. Kays & J. Giacalone. 2006. Ocelot (*Leopardus pardalis*) predation on Agoutis (*Dasyprocta punctata*). Biotropica 38 (5): 691-694.

Araúz., J. 2005. La distribución geográfica del zorrillo o gato cañero, *Conepatus semiestratus* (Carnivora: Mustelidae) en Panamá. Tecnociencia 7 (2): 87- 94.

Bustamante, A., R. Moreno & A. Artavia. 2011 En busca de soluciones para la sobrevivencia del jaguar en la Península de Osa, Costa Rica. Mesoamericana 15 (2).

Bustamante, A. 2008. Densidad y uso de hábitat por los felinos en la parte sureste del área de amortiguamiento del Parque Nacional Corcovado, Península de Osa, Costa Rica. Tesis de maestría. Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre. Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. 142 p.

Carrillo, E., Wong, G & Cuarón, A. D. 2000. Monitoring mammal's populations in Costa Rica protected areas under different hunting restrictions. Conserv. Biol. 14 (6): 1580-1591.

Cavalcanti, S. & E, Gese. 2009. Spatial ecology and social interaction of jaguars (*Panthera onca*) in the Southern Pantanal, Brasil. Journal of Mammalogy. 90 (4): 935- 945.

Coates, A. 2001. En la historia geológica, Panamá ha cambiado al mundo. P.18-25. En: Heckadon-Moreno, S. Panamá: Puente biológico. Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Panamá.

CITES, 2007. Apéndices I, II y III. [Online] Retrieved on 25 July 2012 from: www.cites.org

Colwell R.K., Mao C.X. & J. Chang. 2004. Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. Ecology, 85 (10): 2717-2727.

Donoso, E. 2010. Ecología, comportamiento y conservación del ocelote *Leopardus pardalis* (Carnivora: Felidae), en el Bosque Nuboso del Parque Nacional Santa Fe, Provincia de Veraguas. Tesis de Licenciatura. Universidad de Panamá. 153 p.

Eisenberg, J.F. & Thorington, R. 1973. A preliminary analysis of a Neotropical mammal fauna. Biotropica, 5(3): 150-161.

Emmons, L.H. 1997. Neotropical rainforest mammals, a field guide. second Edition. University of Chicago Press. Chicago and London. 307 pp.

Foerster, C. 1998. Ecología de la danta centroamericana (*Tapirus bairdii*) en un bosque lluvioso tropical de Costa Rica. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica.

Foerster, C. & C. Vaughan. 2002. Home range, habitat use, and activity of baird´s tapir in Costa Rica. Biotropica 34(3): 423-437.

Goldstein, I., V. Guerrero & R. Moreno. 2008. Are there Andean bears in Panama?. Ursus 19 (2).

Gotelli N.J. & R.K. Colwell. 2001. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species. Ecology Letters, 4: 379-391.

Harmsen, B., R. Foster & C. P. Doncaster. 2010. Heterogeneous capture rate in low density populations and consequences for capture-recapture analysis of camera trap data. The Society of Population Ecology. Publish Online Spring 2010.

Holdridge, L. R. 1947. Determination of World Plant Formations from SimpleClimatic Data. Science Vol 105 No. 2727: 367-368.

IGNTG (Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia). 2007. Atlas nacional de la República de Panamá. Tercera edición. Panamá. 222p

Hoogesteijn, R. & A. Hoogesteijn. 2011. Estrategias anti-depredación para fincas ganaderas en Latinoamérica. Una Guía. Panthera. Graficas y editora Microart Ltd., Campo Grande, MS, Brasil, 56 pp. (Edición en español).

Jorgenson, J., & K. Redford. 1993. Humans and big cats as predator in the Neotropic. In: Mammals as predator. Dunstone, N. & M. L. Gorman. , Symp. Zool. Soc. Of London, 65: 367-390.

Karanth, U. & M. Sunquist. 1992. Population structure, density and biomass of large herbivores in the tropical forest of Nagarahole, India. Journal of Tropical Ecology 8: 21-35.

Kawanishi, K. & M. Sunquist. 2004. Conservation status of tigers in a primary rainforest of Peninsular Malaysia. Biological Conservation 120: 329-344.

Maffei, L., A. Noss, E. Cuellar & D. Rumiz. 2005. Ocelot (*Felis pardalis*) population densities, activity, y ranging behavior in the dry forests of eastern Bolivia: data from camera trapping. Journal of Tropical Ecology 21: 1-6.

Méndez, E. 1993. Los roedores de Panamá. Impresora Pacífico S.A. 372 p.

Méndez-Carvajal, P.G. 2011. Population Size, Distribution and Conservation Status of Howler Monkeys (*Alouatta coibensis trabeata*) and Spider Monkeys (*Ateles geoffroyi azuerensis*) on the Azuero Peninsula, Panama. Primate Conservation 26: 13-25.

Meyer, N. 2011. Assessment of the large-sized terrestrial vertebrate community along the Mesoamerican corridor in Panama. Master Thesis, Wageningen University, The Netherlands.

Monroy-Vilchis, O., C. Rodríguez-Soto, M. Zarco-Gonzales & V. Urios. 2009. Cougar and jaguar habitat use and activity pattern in Central Mexico. Animal Biology 59: 145- 157.

Moreno R. 2006. Parámetros poblaciones y aspectos ecológicos de los felinos y sus presas en Cana, Parque Nacional Darién, Panamá. Master Thesis, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

Moreno, R., R. Kays & R. Samudio, Jr. 2006. Competitive release in diet of ocelots (*Leopardus pardalis*) and puma (*Puma concolor*) after jaguar (*Panthera onca*) decline. Journal of Mammalogy 87 (4): 808-816.

Moreno R. & A. Bustamante. 2007. Estatus del Jaguar *(Panthera onca),* Otros Felinos y sus Presas, Utilizando Cámaras Trampa en la Región del Alto Chagres, Panamá. Informe Final del Proyecto del Alto Chagres, Densidad de Jaguares.

Moreno R. & A. Bustamante-Ho. 2008. Uso de de cámara trampas y observación de huellas de mamíferos y otras especies en el camino del oleoducto, parque Nacional Soberanía, Panamá. Evaluación del uso del Parque Nacional Soberanía por Felinos y otras especies. Fase de estudio piloto.

Moreno R. & A. Bustamante. 2009. Datos ecológicos del ocelote (*Leopardus pardalis*) en cana, parque nacional Darién, Panamá; utilizando el método de cámaras trampa. Tecnociencia, 11 (1): 91-102.

Moreno, R., A. Bustamante & P. Méndez. En prensa. Jaguares (*Panthera onca*) en Panamá: Estado actual y conservación. Libro del Jaguar en el siglo XXI: La perspectiva Continental.

Ochoa-Gaona, S. 2008.Una perspectiva de paisaje en el manejo del Corredor Biológico Mesoamericana. En: Evaluación y conservación de biodiversidad en paisajes fragmentados de Mesoamerica. INBio. 1st edition. 620p.

Olmos, M., Y. Mendoza & R. Samudio. 2009. Estimación de la densidad del jaguar (*Panthera onca*) en la Cuenca del Río Gatún, Alto Chagres. Pp. 26- 44. En: Productos del Proyecto "Construyendo un Mecanismo para medir el éxito de la conservación en el alto Chagres- Periodo de Monitoreo 2006- 2008". Sociedad Mastozoológica de Panamá (SOMASPA) 116p

Otis, D., K. Burnham, G. White, D. Yerson. 1978. Statistical inference from capture data on closed animal population. Wildlife Monograph 62: 1-35.

Polisar, J. 2002. Componentes de la base de presas de jaguar y puma en Piñero, Venezuela. Pág 151-182 *en* Medellín, R., C. Equihua, Ch. L. B. Chetkiewicz, P. G. Crawshaw Jr., A. Rabinowitz, K. H. Redford, J. G. Robinson, E. W. Sanderson & A. B. Taber, compiladores. El Jaguar en el Nuevo Milenio. Fondo de Cultura Económico. Mexico, D. F.

Reid F. 2009. A Field Guide to the Mammals of Central and Southeast Mexico. Oxford University Press, Inc. Second edition. 348 pp.

Reid, F. 1997. A field guide to the mammals of Central and Southeast America. Oxford University Press, Inc. 334 pp.

Rexstad, E. y K. Burnham. 1991. User´s guide for interactive program Capture. Fort Collins, CO: Colorado Cooperative Fish y Wildlife Research Unit, Colorado State University.

Samudio, Jr., R. 2002. Mamíferos de Panamá. P. 415-451. En G. Ceballos & J. Simonetti (eds). Diversidad y Conservación de los mamíferos Neotropicales. CONABIO-UNAM. México, D.F.

Schaller, G. 2011. La política esta matando a los grandes felinos. Revista de la National Geographic Society en español. Edición de Diciembre de 2011. 50-53.

Smith F.A., Lyons S.K., Ernest S.K.M., Jones K.E., Kaufman D.M., Dayan T., Marquet P.A., Brown J.H & J.P.Haskell. 2003. Body Mass of Late Quaternary Mammals. Ecology, 84 (12): 3043.

Sunquist, M., & Sunquist, F. 2002. Wild cats of the World. The University of Chicago Press. 452 pp.

Superina, M., F. Miranda & A. Abba. 2010. Edentata: The news letter of the IUCN/SSC anteater, sloth and armadillo specialist group. 11 (2) 103- 105.

Terborgh, J., J. Estes, P. Paquet, K. Ralls, D. Boyd-Heger, B. Miller & R. Noss. 1999. The roll of top carnivore in regulating terrestrial ecosystem. Pages 39-64 in M. E. Soule and J. Terborgh, editors. Continental Conservation: scientific foundation of regional reserve network. Island, Washington, D. C., USA.

Tobler M.W., Carrillo-Percastegui S.E., Leite Pitman R., Mares R. & G. Powell. 2008. An evaluation of camera traps for inventorying large-and medium-sized terrestrial rainforest mammals. Animal Conservation. 11: 169-178.

UNESCO, 1973. Clasificación internacional y cartografía de la vegetación. Pp. 68- 89. En: International Classification and mapping of vegetation. UNESCO serie 6. Ecology and Conservation. Paris. 93 p.

Webb, D. 2003. El gran intercambio americano de fauna. p. 127-136. En: Coates, A. (compilador). Paseo Panthera: Una historia de la naturaleza y cultura de Centroamérica. Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Panamá.

Wright J.S., Zeballos H., Domínguez I., Gallardo M.M., Moreno M.C. & R. Ibáñez. 2000. Poachers Alter Mammal Abundance, Seed Dispersal and Seed Predation in a Neotropical Forest. Conservation Biology, 14 (1): 227-239.

Zeller, K. & A. Rabinowitz. 2011. Using geographic information system for range-wide species conservation planning. In: Geographic Information System. Editor: Christofer J. Dawsen. Chapter 4: 1-20.